



Söömishäirete skriiningtest SCOFF

Ere Vasli

Ere.Vasli@lastehaigla.ee

Lastepsühhiaater
SA Tallinna Lastehaigla

24.Aprillil 2015.a.



Varane märkamine ja ravi

- Esmane kliiniline pilt võib olla erinev, esineda võivad nii psühhiaatrilised kui ka somaatilised nähud;
- Oluline mitmekülgne seisundi hindamine;
- Lastel ja noortel kasvukõvera kasutamine.

SCOFF

John F Morgan, Fiona Reid, and J Hubert Lacey; BMJ 1999

1. Kas sa oksendad, kui su kõht on ebamugavalt täis?
2. Kas sa muretsed, et oled kaotanud kontrolli selle üle, kui palju sööd?
3. Kas sa oled hiljuti võtnud kaalus alla rohkem kui 6 kg 3 kuu jooksul?
4. Kas sa arvad, et oled paks, kuigi teised ütlevad, et oled liiga kõhn?
5. Kas sa ütleksid, et toit domineerib sinu elu üle?

Üks punkt iga „jah“-i eest, skoor ≥ 2 viitab tõenäolisele *anorexia nervosa* või *bulimia* juhtumile.

Loodud kasutamiseks täiskasvanutel.



SCOFFi usaldusväärsus

2 või enam positiivset vastust:

- 100% tundlikkus AN ja BN suhtes;
- 87,5% spetsiifilisus AN ja BN suhtes

Täna tähelepanu eest!

