

Seedetrakti ülaosa röntgenoloogiline uuring

Uuringumeetod

Uuringu käigus tehakse ülesvõtted söögitorust, maost, kaksteistsõrmiksoolest ja vajadusel peen- ja jämesoolest.

Uringuks ettevalmistus

Enne seedetrakti röntgeniuuringut peab olema vähemalt 4 tundi söömata ja joomata.

Uuringu teostamine

Seedetrakti paremaks eristamiseks ümbritsevatest kudedest antakse patsiendile juua röntgenkontrastainet. Tavaliselt on röntgenkontrastseks aineks baarium, imikutel vesilahustuv mitteioonne kontrastaine.

Joodiallergia korral tuleb sellest raviarsti eelnevalt teavitada.

Pärast kontrastaine joomist tehakse röntgeniülesvõtted. Esimesed ülesvõtted tehakse tavaliselt kohe pärast kontrasti joomist ning järgmised võtted vastavalt arsti otsusele.

Röntgeniülesvõtete tegemise ajal palutakse patsiendil olla liigutamata ja mitte hingata.

Uuring kestab kuni 40 minutit.

Pärast uuringut võib laps vabalt liikuda, süüa ja juua.

Võimalikud tüsistused ja ohud

Tüsistusi tuleb seedetrakti röntgenoloogilisel uurimisel ette väga harva.

Röntgeniuuringul viibib inimene ioniseeriva kiirguse mõju all võimalikult lühikest aega.

Sellest tulenevalt on oht, et röntgeniuuringul käinud inimesel tekib ioniseerivast kiirgusest tingitud tervisekahjustus, väga väike.